




GEBELİKTE YAPILAN TEK TOZ
Tdab AŞISI BEBEĞİNİZİ
BOĞMACA KAYNAKLI HASTANE
YATIŞLARINDAN VE BOĞMACA
İLİŞKİLİ ÖLÜMLERDEN %93
ORANINDA KORUR

BEBEĞİN İLK BAĞIŞIKLIĞI ANNENİN
ANTİKORLARI İLE OLUŞMAKTADIR

Bundan dolayı,
HER GEBELİKTE MUTLAKA 1 DOZ Tdab
UYGULANIR

DAHA ÖNCE Td AŞISI UYGULANMIŞSA
BİLE Tdab GEREKMEKTEDİR



BEBEĞİNİZİ BOĞMACAYA VE
NEONATAL TETANOZA KARŞI
KORUYUN !



Tdab (Tetanos, Difteri, Boğmaca) AŞISI



Hiç aşılanmamış gebelerin, en az biri Tdab (difteri, tetanos, aselüler boğmaca) olacak şekilde, 4 hafta arayla 2 doz tetanoz aşısı yaptırmaları önerilmektedir


18-24 hafta aralığında bir doz Tdab aşısı yapılan gebelere, 4 hafta sonra bir doz Td (difteri-tetanos) aşısı uygulanmalıdır

Aşının koruyuculuğu, ikinci dozdan 1 ay sonra yeterli düzeye ulaştığından, bu aşılama şeması doğumdan en az 1 ay önce tamamlanmalıdır

Bu uygulama ile, yaşamının ilk aylarında boğmacaya karşı savunmasız olan bebeklerin, anneleri aracılığıyla korunması amaçlanmaktadır



Tdab AŞISININ ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ İSPATLANMIŞTIR



HASTALIKTAN
KORUNMANIN
EN ETKİLİ YOLU
AŞI
OLMAKTIR

